



Leidraad verbeterplan gebruik tweede en derde keus middelen in de legsector

In de legsector is het gebruik van antibiotica laag (1,78 DDDAs in 2020). Het gebruik van tweede keus middel colistine is echter relatief hoog (0,78 DDDA in 2020), met name bij leghennen. Daarom heeft AVINED voor de legpluimveesector een leidraad ontwikkeld voor een verbeterplan bij de inzet van tweede en derde keus middelen, met extra aandacht voor het gebruik van colistine. Met als doel het gebruik hiervan verantwoord terug te dringen. Zo kan colistine correct ingezet blijven worden ter bevordering van de diergezondheidsstatus van het koppel én wordt de werkzaamheid in de humane zorg behouden.

AVINED adviseert legpluimveehouders om deze leidraad, i.s.m. de GPD-dierenarts, te gebruiken om inzet van tweede en derde keus middelen te bespreken en mogelijk bij een volgende inzet te verlagen of doen voorkomen. Deze leidraad is toepasbaar voor IKB Ei-deelnemers (voorschrift A6.1.12*). Neem voor meer informatie over de leidraad contact op met AVINED: info@avined.nl | 088 998 4340.

Inzet antibiotica

Naam legpluimveebedrijf	
Kipnummer en UBN	
Bedrijfstype	
Houderijvorm	
Type uitloop <i>(indien van toepassing)</i>	<i>Overdekte uitloop Vrije uitloop Biologisch</i>
Ingezette werkzame stof(fen)	
Tweede óf derde keus middel	
Reden inzet antibioticum	<i>Waarom is dit middel ingezet?</i>
Frequentie inzet	<i>Is het middel vaker ingezet in deze ronde? En in de afgelopen drie jaar?</i>
Geboortedatum koppel	
Datum opzet koppel	
Leverdatum antibioticum	
Naam GPD-dierenarts	

Acties voor verbetering

1	Welke acties gaat u ondernemen om de inzet van het tweede en derde keus middel te verlagen in de volgende ronde?	
2	Wat is er nodig om deze acties te kunnen bereiken?	
<i>[Vervolgacties in deze ronde , indien sprake is van de inzet van colistine]</i>		
3	Wanneer heeft u voor het laatst een drink-wateronderzoek uitgevoerd?	<i>Advies: voer minimaal elke ronde, en bij aanwijzingen, een drinkwateronderzoek uit.</i>
4	Wanneer heeft u voor het laatst de klimaatinstellingen van uw stal (of stallen) geëvalueerd en wie heeft u hierbij betrokken?	<i>Advies: laat de klimaatinstellingen in uw stal door een onafhankelijk deskundige doormeten.</i>
5	Welke aanvullende maatregelen heeft u getroffen (bijv. zuren en andere toevoegingen)?	<i>Advies: bespreek / evalueer aanvullende maatregelen met uw dierenarts.</i>
<i>[Vervolgacties voorafgaand aan de volgende ronde, indien sprake is van de inzet van colistine]</i>		
6	Is het nieuwe stalkoppel in de opfok gevaccineerd tegen <i>E. coli</i> ?*	<i>Advies: overleg met uw dierenarts de mogelijkheden voor het gebruik v/e geregistreerd of stalvaccin voor E. coli*.</i>
7	Heeft u nagedacht over mogelijke aanpassingen in de stal in relatie tot het stalklimaat? Zo ja, welke?	<i>Advies: bespreek mogelijke aanpassingen in het stalklimaat met een deskundige.</i>
<i>[Vervolgacties, bij inzet van een tweede en derde keus middel]</i>		
8	Heeft u bovenstaande acties besproken en geëvalueerd met uw dierenarts?	<i>Advies: bespreek vervolgacties met uw dierenarts om de inzet van tweede en derde keus middelen te verlagen</i>

* Attendeer uw dierenarts op het volgende: een stalvaccin wordt op 12 weken leeftijd ingezet, én kent een levertijd van +/- 6 weken. Dit betekent dat u drie tot vier maanden voordat u uw nieuwe kippen krijgt deze actie samen met uw dierenarts moet voorbereiden.