

Schema monitoring voor de vleessector reproductie- en eindbedrijven

Leeftijd/moment monstername	Aantal monsters per stal (tenzij anders aangegeven)	Onderzoek	Monsternemer
Opfok fokdieren (OSF)			
Eerste 3 levensdagen	40 stukken inlegvel per vrachtwagen/aanhanger ¹	Zoönotische salmonella's ^A	VH
4 weken leeftijd	afhankelijk van houderijsysteem ²	Zoönotische salmonella's ^A	VH
2 weken voor overplaatsing ³	afhankelijk van houderijsysteem ²	Zoönotische salmonella's ^A	VH
16 weken leeftijd	60 bloedmonsters	M.g.	DA
Vanaf 15 weken leeftijd	min. 30 bloedmonsters per koppel ⁴	AI	DA
70 dagen na uitkomen tenzij iedere 6 weken gevaccineerd met levend vaccin ⁶	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA
Binnen 6 weken na vaccinatie met geïnactiveerd vaccin ⁷	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA
Binnen 20 dagen voor overplaatsen ⁸	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA
Fokdieren (SF)			
Bij aanvang productieperiode ⁹	60 bloedmonsters	S.P./S.G.	DA
Binnen 2 weken na verplaatsen/aanvang leg en vervolgens iedere 2 weken	afhankelijk van houderijsysteem ²	Zoönotische salmonella's ^A	VH
2x per ronde ¹⁰	afhankelijk van houderijsysteem ²	Zoönotische salmonella's ^A	BA
Bij aanvang productieperiode ⁹ en vervolgens iedere 90 dagen	60 bloedmonsters	M.g.	DA
1x per jaar ¹¹	min. 30 bloedmonsters per bedrijf (min. 5 per stal) ⁵	AI	DA
40-48 weken leeftijd	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA
70-75 weken leeftijd	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA
Opfok ouderdieren (SO)			
Eerste 3 levensdagen	40 stukken inlegvel per vrachtwagen/aanhanger ¹	Zoönotische salmonella's ^A	VH
4 weken leeftijd	afhankelijk van houderijsysteem ²	Zoönotische salmonella's ^A	VH
2 weken voor overplaatsing ³	afhankelijk van houderijsysteem ²	Zoönotische salmonella's ^A	VH
16 weken leeftijd	60 bloedmonsters	M.g.	DA
Vanaf 15 weken leeftijd	min. 30 bloedmonsters per koppel ⁴	AI	DA
70 dagen na uitkomen tenzij iedere 6 weken gevaccineerd met levend vaccin ⁶	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA
Binnen 6 weken na vaccinatie met geïnactiveerd vaccin ⁷	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA
Binnen 20 dagen voor overplaatsen ⁸	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA
Ouderdieren (SV)			
Bij aanvang productieperiode ⁹	60 bloedmonsters	S.P./S.G.	DA
Binnen 2 weken na verplaatsen/aanvang leg en vervolgens iedere 2 weken	afhankelijk van houderijsysteem ²	Zoönotische salmonella's ^A	VH
2x per ronde ¹⁰	afhankelijk van houderijsysteem ²	Zoönotische salmonella's ^A	BA
Bij aanvang productieperiode ⁹ en vervolgens iedere 90 dagen	60 bloedmonsters	M.g.	DA
1x per jaar ¹¹	min. 30 bloedmonsters per bedrijf (min. 5 per stal) ⁵	AI	DA
40-48 weken leeftijd	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA
70-75 weken leeftijd	min. 30 bloedmonsters	NCD	DA

Vleeskuikens (SS)			
Eerste drie levensdagen	40 stukken inlegvellen per vrachtwagen/aanhanger ¹	Zoönotische salmonella's ^A	VH
Max. 21 dagen voor slachtdatum	2 paar overschoentjes ¹²	Zoönotische salmonella's ^A	DA
1x per jaar ¹³	3 paar overschoentjes ¹²	Zoönotische salmonella's ^A	BA
4-6 weken leeftijd	min. 30 bloedmonsters per koppel (min. 5 per stal) ⁵	NCD	DA
70 dagen na uitkomen tenzij iedere 6 weken gevaccineerd met levend vaccin ⁶	min. 30 bloedmonsters per koppel (min. 5 per stal) ⁵	NCD	DA
1x per jaar ¹⁴	min. 30 bloedmonsters per koppel (min. 5 per stal) ⁵	AI	DA

Vleeskalkoenen (KS)			
Max. 21 dagen voor slachtdatum	2 paar overschoentjes ¹²	Zoönotische salmonella's ^B	VH
1x per jaar (10% van de bedrijven) ¹⁰	3 paar overschoentjes ¹²	Zoönotische salmonella's ^A	BA
1x per ronde ¹⁶	min. 30 bloedmonsters per koppel (min. 5 per stal) ⁵	AI	DA
Vanaf 13 weken leeftijd en 20 dagen voor overplaatsen	min. 30 bloedmonsters per koppel (min. 5 per stal) ⁵	NCD	DA
Max. 21 dagen voor slachtdatum	min. 24 bloedmonsters per koppel	M.g.	DA

Legenda

1 Genomen uit de onderste kratten, containers of dozen, samengevoegd tot een verzamelmonster.

2 Afhankelijk van houderijsysteem: 5 paar overschoentjes gepoold tot 2 monsters óf 2 pools á 150gr feces, of combinatie 1 paar overschoentjes en veegdoekjes óf 4 of meer veegdoekjes (tenminste 900 cm2/doekje)

3 Voor overplaatsing naar een bedrijf waar ze als vermeerderingsdier of legghen wordengehouden of voor overgang naar de legfase.

4 Groep dieren met dezelfde gezondheidsstatus die in dezelfde stal of binnen dezelfde ruimte worden geplaatst of gehouden en die een epidemiologische eenheid vormen. (koppel=stal)

5 Evenredig verdeeld naar het aantal dieren per stal.

6 Tenzij iedere 6 weken door een dierenarts gevaccineerd met levende entstof d.m.v. spray of aerosol.

7 Vaccinatie met geïnactiveerd vaccin dient te worden uitgevoerd binnen 22 weken na uitkomen.

8 Voor zover het koppel op de dag van verplaatsen 28 dagen of ouder is.

9 Bij aanvang van iedere productieperiode van het koppel.

10 Deze monstername mag de reguliere monstername door de veehouder vervangen.

11 Op een leeftijd van minimaal 45 weken.

12 Samengevoegd tot een verzamelmonster.

13 Bij 10% van de bedrijven.

14 Op een leeftijd van minimaal 4 weken.

15 Gelijkmatic verdeeld over de stallen, ook eventuele niet-uitloopstallen.

16 Op een leeftijd van minimaal 18 weken, tenzij alleen hennen aanwezig zijn op het bedrijf, dan op een leeftijd van minimaal 13 weken.

A S.E., S.T., S.H., S.I., S.V., (S.J.)

B S.E., S.T., overige salmonella's

VH Veehouder

DA Dierenarts of dierenartsassistent paraveterinair

BA Bevoegde autoriteit (aangewezen door de NVWA)

AI aviaire influenza

M.g. *Mycoplasma gallisepticum*

NCD Newcastle Disease

S.P./S.G. *Salmonella* Pullorum/Gallinarum

S.E., S.T., S.H., S.I., S.V., (S.J.) *Salmonella* Enteritidis, *Salmonella* Typhimurium (ook monofasisch), *Salmonella* Hadar, *Salmonella* Infantis, *Salmonella* Virchow, (*Salmonella* Java)

Bovenstaand schema is gebaseerd op Europese en nationale regelgeving, 'Regeling houders van dieren'.